

镶夜蛾属一新种及一新纪录

(鳞翅目: 夜蛾科)

陈 一 心

(中国科学院动物研究所, 北京)

本文记述镶夜蛾属 *Trichosea* Grote 一新种及一中国新纪录。

张镶夜蛾 *Trichosea zhangii* 新种

翅展 38—43mm。头部乳黄色,下唇须第1、2节外侧大部黑色,复眼外后方黑色,雄蛾触角线形,触角干黑色,两侧饰有淡黄色鳞片,复眼表面有纤毛;胸部乳黄色,翅基片基部及中部有黑斑,后胸有一V形黑纹及二黑斑,足黄白色,胫节与跗节各有黑斑,中足跗节大部分呈黑褐色;腹部淡黄色,背面有一列黑色毛簇,腹两侧各有一列黑斑;前翅乳黄色,基线双线黑色,自前缘至亚中褶,外一线间断,内线双线黑色,内一线间断为4个黑长点,外一线前端为黑弧纹,其后为波浪形细线,环纹大,为一明显粗黑环,肾纹由3个黑色三角形纹组成,呈椭圆形,中线黑色,在肾纹前为一斜纹,在中室后为一片黑云,约呈斜三角形,并由

翅脉分割成4片,外线黑色,前端为一黑斜纹,其后弱而模糊,并间断为点列,在3脉后与中线融合,亚端线双线,均由黑色锯齿形点组成,在中褶及3—5脉间明显外突,端线由一系列粗黑点组成,缘毛及翅外缘亦有一列黑色粗点;后翅淡黄色,中脉后方区域有暗黄色毛覆盖,横脉纹为一横糊黑点,翅外缘有一列黑点。

雄性外生殖器(图1)钩形突宽,近中部膨大呈十字形,抱器瓣基部宽,向端部渐窄,端半部微弯曲,抱钩约呈指形,斜向背伸,端部达瓣背缘,抱器腹突极发达,端部膨大,背兜宽大,囊形突短,阳茎端基环小,约呈勺形,阳茎细,稍短于抱器




图1 张镶夜蛾 *Trichosea zhangii* sp. nov. 雄性外生殖器

瓣,端部有多列细齿,内囊无角状器。

正模♂, 陕西庙台子, 1981。V. 20, 张宝林采; 副模♂, 同上。存中国科学院动物

研究所。

本种外形略似镶夜蛾 *Trichosea champa* Moore, 主要区别为: 本种后翅端区的各翅脉非黑色, 雄性外生殖器的抱器瓣端半部狭窄。

阴镶夜蛾 *Trichosea funebris* Berio 新纪录

翅展 38mm。头部黑色, 下唇须第 2 节端部、头顶及触角基节白色; 颈板黑色白边, 胸部背面黑色, 翅基片基部有白斑, 后胸有一白斑, 足黑色有白斑, 前足胫节下缘白色; 腹部褐黑色, 背面有一列毛簇; 前翅黄白色, 斑纹与镶夜蛾相似, 但内线不明显间断, 亚端线在中褶及 3—5 脉间外突较分明。

雄性外生殖器钩形突扁, 抱器瓣宽, 端半部背缘稍斜削, 抱钩位于抱器瓣端半部背缘内方, 阳茎粗大, 内囊有细针状角状器丛。

标本记录 云南丽江, 1979. VI。

模式标本产于缅甸。

A NEW SPECIES AND A NEW RECORD OF *TRICHOSEA* FROM CHINA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)

CHEN YI-XIN

(Institute of Zoology, Academia Sinica, Beijing)

This paper reports a new species and a new record of *Trichosea* from China.

1. *Trichosea zhangii* sp. nov.

The new species resembles *Trichosea champa* Moore, but it is distinguished from the latter as follows: 1. the veins of terminal half of hind wing not black; 2. valva tapering to the tip.

Holotype ♂, Miaotaizi, Shannxi Province, 20. VI. 1981, collected by Zhang Bao-lin; para-type ♂, ditto. The types of the new species are deposited in the Institute of Zoology, Academia Sinica.

2. *Trichosea funebris* Berio

New to China, collected from Lijiang, Yunnan Province, VI. 1979.